

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*
Заявка № 23040007 Назва сорту: Інвігор 2070 **Заявник (код):** 3415 **Власник сорту (код):** 3415
Володілець патенту (код): 3415
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.10.2025 **Патент №** 250243
Дата пріоритету: 10.04.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.10.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250471
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	до середніх
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	до широкого
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	довгі	7	
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	короткий	3	до середнього
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	довга	7	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,87	3,39	3,25
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,31	2,96	3,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,44	-0,43	0,27
+, - до усередненої урожайності, %	15,3	-12,7	8,3
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,04	0,05
Тривалість періоду вегетації, діб	290	298	297
Висота рослини, см	132,7	131,7	129,5
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,8	5,3	5,2
Вміст білка, %	19,1	17,6	18,3
Вміст олії, %	46,9	48,4	48,1
Вміст ерукової кислоти, %	0	0,1	0
Вміст глюкозинолатів, %	1,2	0,9	0,9
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	6	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	9	6
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	7	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	6
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.