

**Вид:** Горошок посівний (вика) (ярий) *Vicia sativa* L.**Заявка №** 23177001 **Назва сорту:** Таємниця **Заявник (код):** 3232 **Володілець патенту (код):** 3232**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 08.10.2025 **Патент №** 250199**Дата пріоритету:** 03.11.2023**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                        | Проявлення              | Код | Примітка |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|
| 1  | Сіянець: співвідношення довжини / ширини листочків другого справжнього листка | дуже велике             | 9   |          |
| 2  | Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла                                | наявне                  | 9   |          |
| 3  | Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла                | сильна                  | 7   |          |
| 4  | Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків                           | помірна                 | 5   |          |
| 5  | Час початку цвітіння                                                          | середній                | 5   |          |
| 6  | Стебло: опушення верхнього міжвузля                                           | наявне                  | 9   |          |
| 7  | Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків                                 | слабке                  | 3   |          |
| 8  | Листок: форма верхівки листочків                                              | увігнута                | 7   |          |
| 9  | Листок: листочок за шириною                                                   | середній                | 5   |          |
| 10 | Прилисток: антоціанове забарвлення залозок                                    | слабке                  | 3   |          |
| 11 | Квітка: забарвлення паруса                                                    | світло-фіолетове        | 3   |          |
| 12 | Біб: опушення                                                                 | відсутнє або дуже слабе | 1   |          |
| 13 | Біб: за довжиною (без дзьобика)                                               | середній                | 5   |          |
| 14 | Біб: за шириною                                                               | вузький                 | 3   |          |
| 15 | Біб: дзьобик за довжиною                                                      | короткий                | 3   |          |
| 16 | Біб: кількість насіннєвих зачатків                                            | середня                 | 5   |          |
| 17 | Насіння: маса                                                                 | велика                  | 7   |          |
| 18 | Насінина: форма                                                               | куляста                 | 1   |          |
| 19 | Насінина: основне забарвлення насіннєвої оболонки                             | сіро-коричнєве          | 3   |          |
| 20 | Насінина: коричнева орнаментация                                              | відсутня                | 1   |          |
| 21 | Насінина: виявлення коричневої орнаментации                                   | ознака не визначається  | 0   |          |
| 22 | Насінина: блакитно-чорна орнаментация                                         | відсутня                | 1   |          |
| 23 | Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации                              | ознака не визначається  | 0   |          |
| 24 | Насінина: забарвлення сім'ядолей                                              | сірувато-коричнєве      | 1   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                                                                                                     | Значення |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
|                                                                                                              | С        | Л     | П    |
| Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га |          | 4,88  | 5,72 |
| Урожайність сухої речовини, т/га                                                                             |          | 4,49  | 5,85 |
| +, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га                                                         |          | -0,39 | 0,13 |
| +, - до усередненої урожайності сухої речовини, %                                                            |          | -8,0  | 2,3  |
| Довірчий інтервал, т/га                                                                                      |          | 0,35  | 0,42 |
| Тривалість періоду вегетації, діб                                                                            |          | 65    | 65   |
| Вміст білка, %                                                                                               |          | 21,4  | 20,5 |
| Стійкість до вилягання, бал                                                                                  |          | 4     | 5    |
| Стійкість до посухи, бал                                                                                     |          | 6     | 7    |
| Стійкість проти аскохітозу, бал                                                                              |          | 8     | 9    |
| Стійкість проти бурі іржі, бал                                                                               |          | 8     | 9    |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал                                                                           |          | 7     | 8    |
| Залистяність, %                                                                                              |          | 60,8  | 55,7 |
| Блок                                                                                                         |          | 1     | 1    |
| Напрямок використання                                                                                        |          | корм  | корм |
| Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га                                                     |          | 2,11  | 1,99 |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** П.