

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 23012019 Назва сорту:** Стеліан **Заявник (код):** 2552 **Власник сорту (код):** 2552

**Володілець патенту (код):** 2552

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.10.2025 **Патент №** 250288

**Дата пріоритету:** 18.07.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.11.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250631

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                       | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Колеоптиль: антоціанове забарвлення                                          | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 2  | Рослина: габітус (форма куща)                                                | напіврозлогий            | 5   |          |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                            | помірне                  | 5   |          |
| 4  | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком                             | мала                     | 3   |          |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                  | пізній                   | 7   |          |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                                  | сильний                  | 7   |          |
| 7  | Колос: восковий наліт                                                        | слабкий                  | 3   |          |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                               | сильний                  | 7   |          |
| 9  | Рослина: за довжиною (стебло і колос)                                        | середня                  | 5   |          |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)        | слабко виповнена         | 3   |          |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)                                                  | пірамідальна             | 1   |          |
| 12 | Колос: за щільністю                                                          | нещільний                | 3   |          |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                                    | середній                 | 5   |          |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                               | наявні зубці             | 2   |          |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                                | середні                  | 5   |          |
| 16 | Колос: забарвлення                                                           | біле або солом'яно-жовте | 1   |          |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                          | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса) | широке                   | 7   |          |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                                      | піднесене                | 4   |          |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                                   | середній                 | 5   |          |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                                     | прямий                   | 1   |          |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                         | слабке                   | 3   |          |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою                                       | ледь зігнутий            | 2   |          |
| 24 | Зернівка: забарвлення                                                        | червоне                  | 2   |          |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі                                               | помірне                  | 5   |          |
| 26 | Тип розвитку                                                                 | озимий                   | 1   |          |
| 27 | Зернівка: за довжиною                                                        | довга                    | 7   |          |
| 28 | Зернівка: за шириною                                                         | середня                  | 5   |          |
| 29 | Зернівка: відношення довжина / ширина                                        | середнє                  | 5   |          |
| 30 | Зернівка: за крупністю                                                       | крупна                   | 7   |          |
| 31 | Язичок: проявлення                                                           | довгий                   | 7   |          |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль                                                    | відсутній                | 1   |          |
| 33 | Вушка: за формою                                                             | гострі                   | 2   |          |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                          | сильне                   | 7   |          |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)             | овально-ланцетна         | 3   |          |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки                       | помірний                 | 5   |          |
| 37 | Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні                           | наявне                   | 9   |          |
| 38 | Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні                | слабке                   | 3   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                                                                                      | Значення |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|
|                                                                                               | С        | Л     | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,77     | 7,41  | 6,74 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га                                              | 6,04     | 8,28  | 8,05 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га                                                         | 0,27     | 0,87  | 1,31 |
| +, - до усередненої урожайності, %                                                            | 4,7      | 11,7  | 19,4 |
| Довірчий інтервал, т/га                                                                       | 0,08     | 0,05  | 0,04 |
| Тривалість періоду вегетації, діб                                                             | 256      | 267   | 272  |
| Висота рослини, см                                                                            | 83,8     | 87,8  | 94,4 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г                                             | 35,4     | 45,1  | 43,3 |
| Вміст білка, %                                                                                | 13,8     | 13,1  | 12,7 |
| Вміст сирової клейковини, %                                                                   | 28,5     | 25,4  | 24,2 |
| Показник альвеографа (W), о.а.                                                                | 242,5    | 252   | 216  |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл                                                              | 760      | 973,3 | 885  |
| Стійкість до вилягання, бал                                                                   | 9        | 7     | 7    |
| Стійкість до обсіпання, бал                                                                   | 9        | 9     | 8    |
| Стійкість до посухи, бал                                                                      | 6        | 8     | 7    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал                                                         | 9        | 9     | 6    |
| Стійкість проти бурої іржі, бал                                                               | 9        | 8     | 6    |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал                                                         | 9        | 8     | 9    |
| Стійкість проти мухи шведської, бал                                                           | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал                                                          | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість проти летючої сажки, бал                                                            | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість проти твердої сажки, бал                                                            | 9        | 8     | 9    |
| Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал                                      |          | 8     |      |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал                                                            | 7        | 6     | 7    |
| Морозостійкість за штучного проморожування, бал                                               |          | 5     |      |
| Блок                                                                                          | 1        | 1     | 1    |
| Напрямок використання                                                                         | ф        | цпн   | ф    |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**