

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 23045019 Назва сорту:** СІБЕЛЛА **Заявник (код):** 1783 **Власник сорту (код):** 1783

**Володілець патенту (код):** 1783

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.11.2025 **Патент №** 250368

**Дата пріоритету:** 20.11.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.11.2025

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250644

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                           | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення                                              | наявне                   | 9   |          |
| 2  | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                              | помірна                  | 5   |          |
| 3  | Рослина: тип росту                                                               | напівдетермінантний      | 2   |          |
| 4  | Рослина: габітус (положення гілок)                                               | прямий                   | 1   |          |
| 5  | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)              | світло-коричневе         | 2   |          |
| 6  | Рослина: за висотою                                                              | середня                  | 5   |          |
| 7  | Листок: пухирчастість                                                            | помірна                  | 5   |          |
| 8  | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)                              | загостренойцеподібна     | 3   |          |
| 9  | Листок: розмір бічного листочка                                                  | великий                  | 7   |          |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                                       | помірна                  | 5   |          |
| 11 | Квітка: забарвлення                                                              | фіолетове                | 2   |          |
| 12 | Біб: забарвлення                                                                 | світло-коричневе         | 1   |          |
| 13 | Насінина: розмір                                                                 | малий                    | 3   |          |
| 14 | Насінина: форма                                                                  | видовжено-плеската       | 4   |          |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки                                           | жовто-зелене             | 2   |          |
| 16 | Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази      | ознака не визначалась    | 0   |          |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика                                                    | сіре                     | 1   |          |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика                                           | як у насіннєвій оболонки | 1   |          |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | середній                 | 5   |          |
| 20 | Рослина: час достигання                                                          | середній                 | 5   |          |
| 21 | Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин                         | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 22 | Насіння: маса 1000 насінин                                                       | від малої до середньої   | 4   |          |
| 23 | Насіння: глянуватість                                                            | відсутня або слабка      | 1   |          |

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник                                                                                      | Значення |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                               | С        | Л        | П        |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 2,34     | 3,30     | 3,18     |
| Урожайність (за стандартної вологості), т/га                                                  | 1,27     | 3,87     | 3,84     |
| +, - до усередненої урожайності, т/га                                                         | -1,07    | 0,57     | 0,66     |
| +, - до усередненої урожайності, %                                                            | -45,7    | 17,3     | 20,8     |
| Довірчий інтервал, т/га                                                                       | 0,10     | 0,07     | 0,07     |
| Тривалість періоду вегетації, діб                                                             | 116      | 118      | 124      |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г                                               | 152,6    | 169,8    | 165      |
| Висота рослини, см                                                                            | 51,5     | 65,6     | 70,3     |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см                                                         | 11       | 12,9     | 14       |
| Стійкість до вилягання, бал                                                                   | 9        | 9        | 8        |
| Стійкість до обсіпання, бал                                                                   | 7        | 9        | 8        |
| Стійкість до посухи, бал                                                                      | 7        | 9        | 8        |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал                                                            | 9        | 8        | 7        |
| Стійкість проти аскохітозу, бал                                                               | 9        | 9        | 7        |
| Стійкість проти бактеріозу, бал                                                               | 8        | 8        | 8        |
| Стійкість проти септоріозу, бал                                                               | 9        | 8        | 7        |
| Стійкість проти фузаріозу, бал                                                                | 9        | 9        | 9        |
| Вміст білка, %                                                                                | 41,8     | 39       | 40,2     |
| Вміст олії, %                                                                                 | 20,8     | 21,9     | 21,7     |
| Блок (група стиглості)                                                                        | 7        | 7        | 7        |
| Напрямок використання                                                                         | зерн     | зерн     | зерн     |
| Якість                                                                                        | сбіл, сл | сбіл, сл | сбіл, сл |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.