

Вид: Помідор їстівний *Solanum lycopersicum* L.

Заявка № 2025115014 Назва сорту: Родіум Заявник (код): 840 Власник сорту (код): 840

Підтримувач сорту (код): 840

Дата пріоритету: 15.07.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 17.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250562

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака                                                                                                       | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля                                                                | відсутнє                 | 1   |          |
| 2  | Рослина: тип розвитку                                                                                        | індетермінантний         | 2   |          |
| 3  | Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжвузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)          | ознака не визначається   | 0   |          |
| 4  | Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині                                                            | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 5  | Лише індетермінантні сорти. Стебло: міжвузля за довжиною між 1 і 4 суцвіттям                                 | середнє                  | 5   |          |
| 6  | Листок: положення (у середній третині рослини)                                                               | напівпоникле             | 7   |          |
| 7  | Листок: за довжиною                                                                                          | довгий                   | 7   |          |
| 8  | Листок: за шириною                                                                                           | широкий                  | 7   |          |
| 9  | Листок: за розсіченістю                                                                                      | двічі перистий           | 2   |          |
| 10 | Листок: розмір листочків (у середній частині листка)                                                         | великий                  | 7   |          |
| 11 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                                                                   | помірна                  | 5   |          |
| 12 | Листок: глянуватість (як для б)                                                                              | помірна                  | 5   |          |
| 13 | Листок: пухирчастість (як для б)                                                                             | помірна                  | 5   |          |
| 14 | Листок: розмір пухирів (як для б)                                                                            | великий                  | 7   |          |
| 15 | Листок: положення черешка листочків відносно головної осі                                                    | похиле                   | 7   |          |
| 16 | Суцвіття: за типом                                                                                           | переважно не галузисте   | 1   |          |
| 17 | Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)                                                                    | відсутня                 | 1   |          |
| 18 | Квітка: опушення приймочки маточки                                                                           | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 19 | Квітка: забарвлення                                                                                          | жовте                    | 1   |          |
| 20 | Квітконіжка: відокремлюючий шар                                                                              | наявний                  | 9   |          |
| 21 | Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чашечки) | коротка                  | 3   |          |
| 22 | Плід: розмір                                                                                                 | середній                 | 5   |          |
| 23 | Плід: відношення довжини до діаметра                                                                         | середнє                  | 5   |          |
| 24 | Плід: форма поздовжнього розрізу                                                                             | округла                  | 3   |          |
| 25 | Плід: ребристість біля плодоніжки                                                                            | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 26 | Плід: форма поперечного перерізу                                                                             | кругляста                | 2   |          |
| 27 | Плід: заглиблення біля плодоніжки                                                                            | відсутнє або дуже мілке  | 1   |          |
| 28 | Плід: розмір рубця плодоніжки                                                                                | малий                    | 3   |          |
| 29 | Плід: розмір квіткового рубця                                                                                | малий                    | 3   |          |
| 30 | Плід: форма кінця плоду                                                                                      | плеската                 | 3   |          |
| 31 | Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі                                                               | малий                    | 3   |          |
| 32 | Плід: перикарпій за товщиною                                                                                 | середній                 | 5   |          |
| 33 | Плід: кількість насінневих камер                                                                             | три-чотири               | 3   |          |
| 34 | Плід: зелене плече (перед достиганням)                                                                       | відсутнє                 | 1   |          |
| 35 | Плід: розмір зеленого плеча (перед достиганням)                                                              | ознака не визначається   | 0   |          |
| 36 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиганням)                                           | ознака не визначається   | 0   |          |
| 37 | Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиганням)                             | ознака не визначається   | 0   |          |
| 38 | Плід: забарвлення (за достигання)                                                                            | червоне                  | 5   |          |
| 39 | Плід: забарвлення м'якоті (за достигання)                                                                    | червоне                  | 5   |          |
| 40 | Плід: за твердістю                                                                                           | твердий                  | 7   |          |
| 41 | Плід: термін лежкості                                                                                        | тривалий                 | 7   |          |
| 42 | Час цвітіння                                                                                                 | середній                 | 5   |          |
| 43 | Час достигання                                                                                               | середній                 | 5   |          |
| 44 | Плід: вміст сухої речовини (за достигання)                                                                   | середній                 | 5   |          |
| 45 | Чутливість до сріблястості                                                                                   | несприятливий            | 1   |          |
| 46 | Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>                                                                 | відсутня                 | 1   |          |
| 47 | Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>                                                                  | наявна                   | 9   |          |
| 48 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>                                          | наявна                   | 9   |          |
| 49 | Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>                                  | наявна                   | 9   |          |
| 50 | Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> ( <i>Fulvia fulva</i> )                                           | наявна                   | 9   |          |
| 51 | Стійкість проти <i>Tomato Mosaic Virus</i>                                                                   | наявна                   | 9   |          |
| 52 | Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>                                                                | відсутня                 | 1   |          |
| 53 | Стійкість проти <i>Pyrenochaeta lycopersici</i>                                                              | відсутня                 | 1   |          |
| 54 | Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.                                                                      | відсутня                 | 1   |          |
| 55 | Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>                                                | наявна                   | 9   |          |
| 56 | Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>                                                                | відсутня                 | 1   |          |
| 57 | Стійкість проти <i>Tomato Yellow Leaf Curl Virus</i>                                                         | відсутня                 | 1   |          |
| 58 | Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus</i>                                                             | відсутня                 | 1   |          |
| 59 | Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>                                                                    | відсутня                 | 1   |          |
| 60 | Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>                                                                   | відсутня                 | 1   |          |
| 61 | Стійкість проти <i>Tomato torrado virus</i> (ToTV)                                                           | відсутня                 | 1   |          |
| 62 | Лише індетермінантні сорти. Рослина: за висотою                                                              | висока                   | 7   |          |
| 63 | Плід: зелені смуги (перед достиганням)                                                                       | відсутні                 | 1   |          |
| 64 | Плід: глянуватість шкірки                                                                                    | сильна                   | 3   |          |
| 65 | Плід: епідерміс                                                                                              | знебарвлений             | 1   |          |

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 210. Вміст каротину, мг % – 3,1; сухої речовини в плоді, % – 2,6; вітаміну С, мг % – 21; загального цукру, % – 6,4. Загальна кислотність, % – 3. Маса товарного плоду, г – 190. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 110. Тривалість періоду плодоношення, діб – 125. Стійкість проти збудників хвороб, балів (1–9): вірус мозаїки томата (*Tomato Mosaic tobamovirus*) – 9, вірус коричневої зморшкуватості плодів томатів (*Tomato Brown Rugose Fruit Virus*) – 9, вертицильозне в'янення (*Verticillium albo-atrum*) – 9, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*) – 8, кладоспоріоз або бура (оливкова) плямистість (*Fulvia fulva* (ex. *Cladosporium fulvum*) – 8, сіра плямистість листків – 6.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Зг.**