

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam.

Заявка № 23546002 Назва сорту: Одона **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Володілець патенту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.11.2025 **Патент № 250297**

Дата пріоритету: 13.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 07.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250550

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	середній	2	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	слабке	3	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	нещільна	3	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	малий	3	
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	вузько еліптична	1	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	пряме	1	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	обернено-ланцетна	12	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	наявна	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	нещільна	3	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листок: жилкування	напіввільноподібне	3	
33	Пазушне галузнення	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку стрілкування	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (під час квітання)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітання)	відсутня	1	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітання)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	ознака не визначалась	0	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	ознака не визначалась	0	
41	Стійкість проти попелиць <i>Nasonovii arabis nigri</i> (Nr). Біотин Nr: 0	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	опуклий	5	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблових типу. Стебло: забарвлення м'якоти	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 23,2. Середня маса плоду, г – 517. Щільність головки, балів – 5. Тривалість періоду до досягання, діб – 54. Лежкість, % – 61. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 7, антракноз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.