

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam.

Заявка № 2025546003 Назва сорту: Ольгада **Заявник (код):** 753 **Власник сорту (код):** 753

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.11.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250634

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	пряме	1	до напівпрямого
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	сильний	3	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	середній	5	до великого
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	вузько еліптична	1	
14	Листок: за товщиною	середній	5	до товстого
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	пряме	1	до напівпрямого
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	еліптична	2	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	зелене	1	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3	до помірної
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	до слабкої
26	Листок: розмір пухирців	малий	3	
27	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутня	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листок: щільність надрізаності краю	ознака не визначається	0	
31	Листок: за типом надрізаності	ознака не визначається	0	
32	Листок: жилкування	нев'ялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	сильне	7	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку стрілкування	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (під час квітвання)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час квітвання)	ознака не визначалась	0	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітвання)	ознака не визначається	0	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип II	відсутня	1	
41	Стійкість проти попелиць <i>Nasonovii arabis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	наявна	9	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленувань	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 3,1. Середня маса плоду, г – 550. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, діб – 50. Лежкість, % – 85. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 7, борошниста роса – 5, антракноз – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.