

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045017 Назва сорту: АМІСТАР **Заявник (код):** 2852 2853 **Власник сорту (код):** 2852 2853
Володілець патенту (код): 2852 2853
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 22.12.2025 **Патент №** 250621
Дата пріоритету: 05.02.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 26.12.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250877
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	сильна	7	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	темно-сіре	6	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	3,20	3,13
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,25	2,79	3,41
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,92	-0,41	0,28
+, - до усередненої урожайності, %	-42,4	-12,8	8,9
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,08	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	101	111	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	144,1	177,1	178
Висота рослини, см	65,3	84,7	87,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,1	12,6	13,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	5
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	41,1	39,1	39
Вміст олії, %	21,7	22,4	22,6
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.