

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045024 Назва сорту: Анніт **Заявник (код):** 1426 **Власник сорту (код):** 1426
Володілець патенту (код): 1426
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.12.2025 **Патент №** 250476
Дата пріоритету: 06.03.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.12.2025
Свідцтво про державну реєстрацію № 250702
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: забарвлення	темно-сіре	6	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричнєве	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яніжки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	сильна	4	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	3,20	3,13
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,13	3,05	3,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,04	-0,15	0,25
+, - до усередненої урожайності, %	-47,9	-4,7	8,0
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,08	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	104	114	113
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	139,9	158,2	156,3
Висота рослини, см	54,9	64,9	75,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	8	12,5
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	7	9
Вміст білка, %	41,4	38,7	39,4
Вміст олії, %	19,9	20,5	20,2
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.