

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.**Заявка №** 24045018 **Назва сорту:** ЖАДОР **Заявник (код):** 2852 2853 **Власник сорту (код):** 2852 2853**Володілець патенту (код):** 2852 2853**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2025 **Патент №** 250622**Дата пріоритету:** 05.02.2024**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250878**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	темно-коричневе	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опукулостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,34	3,30	3,18
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,13	3,48	3,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,21	0,18	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	-51,7	5,5	10,7
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	112	121	122
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	152,9	183,5	190,4
Висота рослини, см	59,1	81,7	91,2
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,8	12,5	10,5
Стійкість до вилягання, бал	9	7	7
Стійкість до обсіпання, бал	6	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	5
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	7	9
Вміст білка, %	41,6	40	40,6
Вміст олії, %	20,1	21	20,8
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.