

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 24045020 Назва сорту: Мілвокі **Заявник (код):** 3202 **Власник сорту (код):** 3202

Володілець патенту (код): 3202

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.12.2025 **Патент №** 250475

Дата пріоритету: 07.02.2024

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.12.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250701

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	трикутна	2	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	мала	3	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,34	3,30	3,18
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,14	3,35	3,17
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,20	0,05	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	-51,3	1,5	-0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	129	131
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	130,2	162,1	161
Висота рослини, см	54,6	82,2	88
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,5	12,4	11,9
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	5	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	7	9
Вміст білка, %	40,5	38,9	39,5
Вміст олії, %	21,5	21,6	21,8
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.