

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.**Заявка № 23045016 Назва сорту:** ОАЦ Абердін **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557**Дата пріоритету:** 27.10.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250772**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	світло-коричневе	1	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	пізній	7	
20	Рослина: час достигання	пізній	7	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	відсутня або дуже слабка	1	
22	Насіння: маса 1000 насінин	середня	5	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,45	3,29	
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	0,78	3,24	
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,67	-0,05	
+, - до усередненої урожайності, %	-68,2	-1,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,67	0,33	
Тривалість періоду вегетації, діб	131	141	
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	171,8	174	
Висота рослини, см	48,9	80,3	
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,8	12	
Стійкість до вилягання, бал	9	8	
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	
Стійкість до посухи, бал	5	7	
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	
Вміст білка, %	42,1	41,4	
Вміст олії, %	20,1	20,9	
Блок (Група стиглості)	8	8	
Напрямок використання	зерн	зерн	
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.