

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.**Заявка № 23045015 Назва сорту:** ОАЦ Бруно **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557**Дата пріоритету:** 27.10.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 12.12.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250771**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насіння: розмір	малий	3	
14	Насіння: форма	округло-видовжена	5	
15	Насіння: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насіння: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насіння: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насіння: забарвлення сім'яної рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від малої до середньої	4	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,34	3,30	3,18
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,04	3,51	3,61
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,30	0,21	0,43
+, - до усередненої урожайності, %	-55,6	6,4	13,5
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	122	127	127
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	155,3	170,1	177,4
Висота рослини, см	55,5	81,4	87,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,7	11,1	12,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	6	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	7	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	42,7	41	41,8
Вміст олії, %	19,5	21	20,8
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.