

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 23045023 Назва сорту: Родзинка **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Володілець патенту (код): 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.12.2025 **Патент №** 250470

Дата пріоритету: 27.11.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.12.2025

Свідоцтво про державну реєстрацію № 250816

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-сіре	5	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	світло-коричневе	4	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час достигання	середній	5	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	від дуже мало до малої	2	
23	Насіння: глянуватість	відсутня або слабка	1	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,34	3,30	3,18
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,07	3,22	3,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	-1,27	-0,08	0,09
+, - до усередненої урожайності, %	-54,3	-2,4	2,8
Довірчий інтервал, т/га	0,10	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	114	121	125
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	118,5	130,5	118,9
Висота рослини, см	56,7	78,1	86,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,6	12,9	13,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	6	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	7	9
Вміст білка, %	41,7	40,1	40,5
Вміст олії, %	19,4	20,4	20,1
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.