

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 24045002 Назва сорту: Хоуден **Заявник (код):** 2061 **Власник сорту (код):** 2061
Володілець патенту (код): 2061
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 09.12.2025 **Патент №** 250473
Дата пріоритету: 16.01.2024
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 08.12.2025
Свідоцтво про державну реєстрацію № 250699
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (положення гілок)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	світло-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: забарвлення	помірно-коричневе	2	
13	Насінина: розмір	малий	3	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	
21	Біб: інтенсивність сірого забарвлення опуклостей насінин	помірна	3	
22	Насіння: маса 1000 насінин	мала	3	
23	Насіння: глянуватість	помірна	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,17	3,20	3,13
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	1,31	3,29	3,59
+, - до усередненої урожайності, т/га	-0,86	0,09	0,46
+, - до усередненої урожайності, %	-39,6	2,8	14,7
Довірчий інтервал, т/га	0,11	0,08	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб	98	111	111
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	132	159,9	157,5
Висота рослини, см	49,6	66,3	69,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10	8,2	9,2
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	7	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	8	9
Вміст білка, %	40,8	39,7	39,4
Вміст олії, %	21,5	21,2	21,3
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.