

Вид: Капуста колърабі *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.**Заявка № 15098002 Назва сорту:** Гігант **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.12.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171308****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення сім'ядолей	відсутнє	1
2	Паросток: інтенсивність зеленого забарвлення сім'ядолей	помірне	5
3	Черешок: перехрещування	відсутнє	1
4	Черешок: за довжиною	довгий	7
5	Черешок: за товщиною	товстий	7
6	Черешок: за положенням у просторі	похилий	3
7	Листкова пластинка: за положенням у просторі	напівпряма	3
8	Листкова пластинка: за довжиною	дуже довга	9
9	Листкова пластинка: за шириною	дуже широка	9
10	Листкова пластинка: форма верхівки	широко заокруглена	5
11	Листкова пластинка: розрілення на частки стосовно центральної жилки (в нижній частині листка)	мало	3
12	Листкова пластинка: кількість часток (у верхній частині листка)	мало	3
13	Листкова пластинка: глибина розчленування (у верхній частині листка)	мілка	3
14	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	плеската	2
15	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5
16	Листкова пластинка: восковість	помірна	5
17	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	1
18	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
19	Стеблоплід: кількість внутрішніх листків	середня кількість	5
20	Стеблоплід: колір шкірки	зелений	2
21	Стеблоплід: форма у поздовжньому розрізі	округла	4
22	Стеблоплід: форма верхівки	виїмкула	7
23	Рослина: початок збиральної стиглості	дуже пізній	9

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 30.Період від повних сходів до початку достигання, діб – 70.Лежкість, балів (1–9) – 9. Вміст вітаміну С, мг % – 47. Вміст загального цукру, % – 7,6. Вміст сухої речовини, % – 8,2. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий, бактеріоз судинний – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.