

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.**Заявка № 15101012 Назва сорту:** Сансет **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.01.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180056****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	відсутнє	1
2	Рослина: за висотою (за збирання)	низька	3
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	коротке	3
4	Листок: положення	напівпрямe	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	широкий	7
7	Листок: відношення ширина/довжина	середнє	5
8	Листок: часточковість	наявна	9
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	стро-зелене	2
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	помірна	5
11	Листок: закручування верхівки	помірне	5
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчастість	слабка	3
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	слабка	3
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Головка: покриття внутрішніми листками	частково покрита	2
17	Головка: за висотою	низька	3
18	Головка: діаметр	малий	3
19	Головка: форма поздовжнього розрізу	поперечно помірно-еліптична	3
20	За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	жовте	2
22	Головка: горбкуватість	помірна	5
23	Головка: текстура	помірна	5
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральnoї стигlosti	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	жовте	2
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від ранньої до середньої	4
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 43. Товарна врожайність, т/га – 41. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 97. Період плодоношення, діб – 14. Вміст білка, % – 1,9. Вміст вітаміну С, мг % – 67. Вміст загального цукру, % – 2,4. Вміст сухої речовини, % – 8,5. Стійкість до хвороб, балів (1-9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, Згр.