

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 15101013 Назва сорту: Треві **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180057

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
2	Рослина: за висотою (за збирання)	висока	7
3	Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка)	довге	7
4	Листок: положення	напівпряме	3
5	Листок: за довжиною	середній	5
6	Листок: за шириною	вузький	3
7	Листок: відношення ширина/довжина	велике	7
8	Листок: часточковість	відсутня	1
9	Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є)	блакитно-зелене	3
10	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9)	сильна	7
11	Листок: закручування верхівки	відсутнє або дуже слабке	1
12	Листок: форма поперечного перерізу	плеската	2
13	Листок: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
14	Листок: гофрованість біля головної жилки	відсутня або дуже слабка	1
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Головка: покриття внутрішніми листками	відкрита	1
17	Головка: за висотою	середня	5
18	Головка: діаметр	середній	5
19	Головка: форма позаднього розрізу	поперечно широко-еліптична	2
20	За винятком сортів з трикутною головою. Головка: закручування краю	слабке	3
21	Головка: забарвлення	зелене	4
22	Головка: горбкуватість	сильна	7
23	Головка: текстура	груба	7
24	Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості	відсутнє	1
25	Квітка: забарвлення	жовте	2
26	Скоростиглість: за весняного садіння	від пізньої до дуже пізньої	8
27	Скоростиглість: за літнього садіння	ранній осінній тип	3
28	Чоловіча стерильність	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна урожайність, т/га – 51. Товарна врожайність, т/га – 48. Період від повних сходів до початку достигання, днів – 105. Період плодоношення, днів – 14. Вміст білка, % – 1,8. Вміст вітаміну С, мг % – 65. Вміст загального цукру, % – 2,3. Вміст сухої речовини, % – 8,7. Стійкість до хвороб, балів (1-9): бактеріоз слизовий – 6, бактеріоз судинний – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.