

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.**Заявка № 23012027 Назва сорту:** Розумниця Одеська **Заявник (код):** 1771 **Власник сорту (код):** 1771**Володілець патенту (код):** 1771**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 22.12.2025 **Патент №** 250607**Дата пріоритету:** 26.07.2023**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 26.12.2025**Свідцтво про державну реєстрацію №** 250869**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака                                                                       | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Колеоптиль: антоціанове забарвлення                                          | відсутнє або дуже слабке | 1   |          |
| 2  | Рослина: габітус (форма куща)                                                | напівпрямий              | 3   |          |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                            | сильне                   | 7   |          |
| 4  | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком                             | велика                   | 7   |          |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)                  | ранній                   | 3   |          |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                                  | сильний                  | 7   |          |
| 7  | Колос: восковий наліт                                                        | помірний                 | 5   |          |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                               | сильний                  | 7   |          |
| 9  | Рослина: за довжиною (стебло і колос)                                        | середня                  | 5   |          |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й найближчим вузлом)        | слабко виповнена         | 3   |          |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)                                                  | пірамідальна             | 1   |          |
| 12 | Колос: за щільністю                                                          | нешільний                | 3   |          |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                                    | середній                 | 5   |          |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                               | наявні остюки            | 3   |          |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                                | середні                  | 5   |          |
| 16 | Колос: забарвлення                                                           | біле або солом'яно-жовте | 1   |          |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                          | помірне                  | 5   |          |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середній третині колоса) | широке                   | 7   |          |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                                      | округле                  | 2   |          |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                                   | середній                 | 5   |          |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                                     | прямий                   | 1   |          |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                         | слабке                   | 3   |          |
| 23 | Нижня квітова луска. Зубець: за формою                                       | ознака не визначається   | 0   |          |
| 24 | Зернівка: забарвлення                                                        | червоне                  | 2   |          |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі                                               | відсутнє або дуже світле | 1   |          |
| 26 | Тип розвитку                                                                 | озимий                   | 1   |          |
| 27 | Зернівка: за довжиною                                                        | середня                  | 5   |          |
| 28 | Зернівка: за шириною                                                         | середня                  | 5   |          |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина                                         | середнє                  | 5   |          |
| 30 | Зернівка: за крупністю                                                       | середня                  | 5   |          |
| 31 | Язичок: проявлення                                                           | короткий                 | 3   |          |
| 32 | Нижня квітова луска: кіль                                                    | відсутній                | 1   |          |
| 33 | Вушка: за формою                                                             | гострі                   | 2   |          |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                          | слабке                   | 3   |          |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок у середній третині колоса)             | яйцеподібна              | 1   |          |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листової пластинки                        | помірний                 | 5   |          |
| 37 | Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні                           | наявне                   | 9   |          |
| 38 | Верхівковий сегмент стрижня колосу: опушення опуклої поверхні                | слабке                   | 3   |          |

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

| Показник                                                                                      | Значення |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                                               | С        | Л     | П     |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,77     | 7,41  | 6,74  |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га                                              | 6,51     | 9,00  | 7,60  |
| +, - до усередненої урожайності, т/га                                                         | 0,74     | 1,59  | 0,86  |
| +, - до усередненої урожайності, %                                                            | 12,8     | 21,5  | 12,8  |
| Довірчий інтервал, т/га                                                                       | 0,08     | 0,05  | 0,04  |
| Тривалість періоду вегетації, діб                                                             | 252      | 265   | 269   |
| Висота рослини, см                                                                            | 92,8     | 95,1  | 98,3  |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г                                             | 41,2     | 45    | 43,8  |
| Вміст білка, %                                                                                | 14,1     | 13,1  | 13,2  |
| Вміст сирової клейковини, %                                                                   | 28,1     | 25,3  | 25    |
| Показник альвеографа (W), о.а.                                                                | 305,3    | 344,3 | 283,6 |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл                                                              | 800      | 900   | 903,3 |
| Стійкість до вилягання, бал                                                                   | 8        | 6     | 6     |
| Стійкість до обсіпання, бал                                                                   | 9        | 9     | 9     |
| Стійкість до посухи, бал                                                                      | 8        | 9     | 8     |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал                                                         | 9        | 7     | 7     |
| Стійкість проти бурі іржі, бал                                                                | 9        | 8     | 6     |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал                                                         | 9        | 9     | 8     |
| Стійкість проти мухи шведської, бал                                                           | 9        | 9     | 8     |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал                                                          | 9        | 9     | 9     |
| Стійкість проти летючої сажки, бал                                                            | 9        | 9     | 9     |
| Стійкість проти твердої сажки, бал                                                            | 9        | 9     | 9     |
| Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал                                      |          | 9     |       |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал                                                            | 7        | 8     | 7     |
| Морозостійкість за штучного проморожування, бал                                               |          | 7     |       |
| Блок                                                                                          | 1        | 1     | 1     |
| Напрямок використання                                                                         | слн      | цїн   | цїн   |

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**