

**Вид:** Конопля посівна *Cannabis sativa* L.

**Заявка № 2025080002 Назва сорту:** Сатіва Українська

**Заявник (код): 3542 Власник сорту (код): 3542 Підтримувач сорту (код): 3542**

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 19.02.2026

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 260143**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Сім'ядоля: форма	середньооберненояце-подібна	2	
2	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Сім'ядоля: забарвлення	світло-зелене	2	
3	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
4	Рослина: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
5	Листок: строкагість	наявна	9	
6	Лише для сортів із строкатими листками. Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	2	
7	Листок: черешок за довжиною	середній	2	
8	Листок: антоціанове забарвлення черешка	помірне	3	
9	Листок: кількість листочків	середня	2	
10	Центральна листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
11	Центральна листкова пластинка: за шириною	середня	5	
12	Лише для сортів типу AS. Час цвітіння чоловічих суцвіть	ознака не визначається	0	
13	Лише для сортів типу AV, AF, HV, HF. Час цвітіння жіночих суцвіть	ранній	3	
14	Лише для сортів типу AS. Суцвіття: антоціанове забарвлення чоловічих суцвіть	ознака не визначається	0	
15	Лише для сортів типу AV, AF, HV, HF. Суцвіття: антоціанове забарвлення жіночих суцвіть	помірне	5	
16	Рослина: співвідношення гермафродитних рослин	відсутнє або мале	1	
17	Рослина: співвідношення жіночих рослин	середнє	3	
18	Рослина: співвідношення чоловічих рослин	середнє	3	
19	Лише для сортів типу HV, HF. Жіноча квітка: приймочки маточки за довжиною	середні	5	
20	Лише для сортів типу HV, HF. Жіноча квітка: приймочки маточки за товщиною	середні	5	
21	Лише для сортів типу HV, HF. Жіноча квітка: закручування приймочок маточки	помірне	5	
22	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Рослина: за природною висотою	ознака не визначається	0	
23	Лише для сортів типу HV, HF. Рослина: за висотою	середня	5	
24	Головне стебло: забарвлення	помірно зелене	2	
25	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Головне стебло: міжвузля за довжиною	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів типу HV, HF. Головне стебло: міжвузля за довжиною	середнє	5	
27	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Головне стебло: за товщиною	ознака не визначається	0	
28	Лише для сортів типу HV, HF. Головне стебло: за товщиною	середнє	2	
29	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Головне стебло: боріздки за глибиною	середні	2	
30	Лише для сортів типу AS, AV, AF. Суцвіття: вміст ТГК	ознака не визначається	0	
31	Лише для сортів типу HV, HF. Суцвіття: вміст ТГК	від високого до дуже високого	8	
32	Суцвіття: вміст загального КБД	низький	3	
33	Суцвіття: вміст загального КБГ	низький	3	
34	Головне стебло: серцевина в поперечному перерізі	середня	2	
35	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Насіння: маса 1000 шт.	середня	3	
36	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Насінина: забарвлення шкірки	сіро-коричнєве	3	
37	Лише для сортів типу AS, AF, HF. Насінина: мармуровість	слабка	3	

**За інформацією, наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Висота рослин, см – 160,0–180,0. Тривалість періоду вегетації до початку цвітіння жіночих рослин, днів – 55–60. Тривалість періоду цвітіння жіночих рослин, днів – 63. Урожайність сухої сировини (за стандартної вологості 12%), т/га – 2,5–3,5. Вміст загального каннабінолу (КБН) у сухій сировині: сума каннабінолів (КБН) і каннабінольних кислот (КБНК) у перерахунку на каннабінол (КБН), % – 0,5. Вміст 9-тетрагідроканнабінолу (ТГК), % – 18–22. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): фузаріоз (*Fusarium* spp.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): павутинний кліщ – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** 3г.