

Вид: Салат посівний стебловий *Lastuca sativa* var. *L. angustana* L.H. Bailey

Заявка № 2025518001 Назва сорту: Кіборг

Заявник (код): 1708 Власник сорту (код): 1708 Володілець патенту (код): 1708

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 16.02.2026 Патент № 260126

Дата пріоритету: 26.09.2025

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.02.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10–12 листків	напівпряме	3	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	ознака не визначалась	0	
9	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
10	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини литків: середній і сильний. Головка: за щільністю	ознака не визначається	0	
11	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	ознака не визначається	0	
12	Лише для сортів маслянистого типу в теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	ознака не визначається	0	
13	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглістю	напівпряме	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма	ланцетна	10	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	гостра	1	
18	Листок: забарвлення	сірувато-зелене	3	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирців	середній	5	
27	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	відсутня	1	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	ознака не визначається	0	
30	Листок: щільність надрізаності краю	ознака не визначається	0	
31	Листок: за типом надрізаності	ознака не визначається	0	
32	Листок: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	відсутнє або дуже слабке	1	
34	Час збиральної стиглості	пізній	7	
35	Час початку стрікування	середній	5	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	середня	5	
37	Рослина: фасціація (під час квітування)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час квітування)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (B1). Ізолят B1: 16 EU, 17 EU, 20–27 EU, 29–31 EU, 33 EU, 35 EU	ознака не визначалась	0	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV). Патотип II	ознака не визначалась	0	
41	Стійкість проти попелиць <i>Nasonovia ribis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Паса 1	ознака не визначалась	0	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
44	Тільки для сортів із Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або слабкий. Рослина: кількість листків	велика	7	
45	Листок: кількість розчленувань	ознака не визначалась	0	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленувань: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за шириною	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначається	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	середнє	5	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за шириною	вузьке	3	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	циліндрична	1	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	білувато-зелене	1	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	білувато-зелене	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 46,5. Тривалість періоду до досягання, діб – 55. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса – 9, борошниста роса – 9, біла гниль – 9, септоріоз – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.