

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 14113009 Назва сорту: Бурштин **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.10.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171335

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотіля	відсутнє	1
2	Рослина: габітус	ознака не визначалась	0
3	Рослина: за довжиною стебла	ознака не визначалась	0
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	відсутнє	1
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	ознака не визначалась	0
9	Стебло: опущення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	середня	5
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за ширину	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
14	Листок: форма	ланцетна	1
15	Листок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма поперечного перерізу	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівлоніkle	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення пилляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	слабка	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	горизонтальне	2
25	Плід: за довжиною	середній	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	помірна	5
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувана	1
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	жовте	1
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	помірна	5
35	Плід: глянсуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	середня	5
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждоліні канавки за глибиною	глибокі	7
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: мякоть за товщиною	середня	5
42	Плодоніжка: за довжиною	середня	5
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: зовнішній вигляд	обгортуюча	2
45	Плід: капсіцин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5
47	Час досягнення	середній	5
48,1	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість проти <i>Potato Virus Y (PVY)</i> : Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти <i>Phytophthora capsici</i>	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 70,2. Тривалість періоду до досягнення, діб – 115. Товщина стінки плоду, мм – 8. Середня маса плоду, г – 100. Вміст вітаміну С, мг% – 180, загального цукру, % – 4,3, клітковини, % – 15,3, сухої речовини, % – 12,0. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1-9): антракноз (*Colletotrichum nigrum* Ell. et Halst.) – 3, гниль верхівкова (*Bacterium lycopersici* Burgw. var. *capsici*), вірусні хвороби (*Pseudomonas solanacearum* (Sm.) Berg.; *Fusarium oxysporum* Schl.; *Verticillium albo-atrum* Reincke et Berthold) – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Згр.