

Вид: Персик звичайний *Prunus persica* (L.) Batsch

Заявка № 2025259004 Назва сорту: МАЛІКС 24

Заявник (код): 3650 3651 **Власник сорту (код):** 3650 **Підтримувач сорту (код):** 3651

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.02.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: розмір	середній	5	
2	Дерево: за силою росту	середнє	5	
3	Дерево: габітус	розлогий	3	
4	Квітконосний пагін: за товщиною	тонкий	3	
5	Квітконосний пагін: міжвузля за довжиною	короткі	3	
6	Квітконосний пагін: антоціанове забарвлення	наявне	9	
7	Квітконосний пагін: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
8	Квітконосний пагін: розміщення генеративних бруньок	щільне	7	
9	Квітка: тип	розетковий	2	
10	Віночок: основне забарвлення (із внутрішнього боку)	світло-рожеве	3	
11	Пелюстка: форма	помірно яйцеподібна	2	
12	Лише сорти з дзвоникоподібним типом квітки. Пелюстка: за шириною	ознака не визначається	0	
13	Лише сорти з розетковим типом квітки. Пелюстка: за шириною	вузька	2	
14	Квітка: кількість пелюсток	п'ять	1	
15	Тичинка: розміщення відносно пелюсток	вище	3	
16	Приймочка: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
17	Пиляки: пилок	наявний	9	
18	Зав'язь: опушення	наявне	9	
19	Прилистки: за довжиною	короткі	3	
20	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
21	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
22	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
23	Листкова пластинка: форма поперечного перерізу	увігнута	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Листкова пластинка: кут основи	гострий	1	
26	Листкова пластинка: кут верхівки	малий	3	
27	Листкова пластинка: забарвлення	світло-зелене	2	
28	Листкова пластинка: почервоніння центральної жилки на нижньому боці листка	наявне	9	
29	Черешок: за довжиною	середній	5	
30	Черешок: нектарники	відсутні	1	
31	Черешок: форма нектарників	ознака не визначається	0	
32	Плід: розмір	великий	7	
33	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
34	Плід: загострення маточкового кінця	наявне	9	
35	Плід: форма маточкового кінця (за винятком загострення)	гостро виступаюча	1	
36	Плід: симетричність (вигляд з маточкового кінця)	помірно асиметричний	2	
37	Плід: помітність шва	помірна	5	
38	Плід: ямка плодоніжки за глибиною	середня	5	
39	Плід: ямка плодоніжки за шириною	вузька	3	
40	Плід: основне забарвлення шкірки	зеленувато-жовте	8	
41	Плід: відносна площа покривного забарвлення шкірки	велика	7	
42	Плід: відтінок покривного забарвлення шкірки	світло-червоний	4	
43	Плід: рисунок покривного забарвлення	мармуровий	4	
44	Плід: опушення шкірки	наявне	9	
45	Плід: щільність опушення шкірки	помірне	5	
46	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: глянуватість	ознака не визначається	0	
47	Лише для сортів без опушення шкірки плоду. Плід: видимість сочевичок	ознака не визначається	0	
48	Плід: шкірка за товщиною	середня	5	
49	Плід: зростання шкірки із м'якоттю	слабке	3	
50	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
51	Плід: основне забарвлення м'якоті	оранжево-жовте	6	
52	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті безпосередньо під шкіркою	слабке	2	
53	Плід: антоціанове забарвлення в центральній частині м'якоті	слабке	2	
54	Плід: антоціанове забарвлення м'якоті навколо кісточки	помірне	2	
55	Плід: волокнистість м'якоті	помірна	2	
56	Плід: цукристість	середня	5	
57	Плід: кислотність	дуже низька	1	
58	Кісточка: розмір у порівнянні з плодом	малий	3	
59	Кісточка: форма (вигляд збоку)	еліптична	3	
60	Кісточка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
61	Кісточка: інтенсивність коричневого забарвлення	середня	5	
62	Кісточка: рельєфність поверхні	порівну ямки і борідки	3	
63	Кісточка: тенденція до розтріскування (розколювання)	відсутня або дуже слабка	1	
64	Кісточка: зростання з м'якоттю	наявне	9	
65	Кісточка: ступінь зростання з м'якоттю	слабкий	3	
66	Час початку розпускання вегетативних бруньок	ранній	3	
67	Час початку цвітіння	ранній	3	
68	Час споживчої стиглості	від дуже раннього до раннього	2	

За інформацією, наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 47,0. Середній урожай з дерева, кг – 40,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 9,5; загального цукру, % – 12,0; фенольних сполук, мг/100 г сирової речовини – 105,0; пектинових речовин, % – 0,82; сухих розчинних речовин, % – 14,0. Загальна кислотність, % – 0,4. Маса плоду (середня), г – 150,0. Маса плоду (максимальна), г – 180,0. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз – 7, моніліальний опік – 7, парша – 7, клястероспоріоз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кісточкова муха – 8, попелиця – 8. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 8. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Зимостійкість, балів (1–9) – 8. Схема садіння, м – 4,0 x 2,0. Група стиглості – рс. Напрямок використання – ун. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.