

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.**Заявка № 14113011 Назва сорту:** Цезаріо **Заявник (код):** 2015 **Власник сорту (код):** 2015**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.12.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171336****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	довга	7
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	більше трьох	3
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	слабка	3
9	Стебло: опущення вузлів	слабке	3
10	Рослина: за висотою	висока	7
11	Листок: пластина за довжиною	дуже довга	9
12	Листок: пластина за шириною	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвильастість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	слабка	3
17	Листок: форма поперечного перерізу	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	напівпоникле	2
20	Квітка: антоціанове забарвлення піляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зелене	3
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	сильна	7
23	Плід: антоціанове забарвлення	наявне	9
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	довгий	7
26	Плід: діаметр	дуже великий	9
27	Плід: відношення довжина/діаметр	середнє	5
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частині	округла	3
30	Плід: хвильастість перикарпію в базальній частині	помірна	5
31	Плід: хвильастість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	сильна	7
35	Плід: глянсуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	увігнута	4
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	тонка	3
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3
43	Плодоніжка: за товщиною	товста	7
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортуча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	пізній	7
47	Час досягнення	пізній	7
48.1	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	ознака не визначалась	0
48.2	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	ознака не визначалась	0
48.3	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	ознака не визначалась	0
49.1	Стійкість проти <i>Potato Virus Y (PVY)</i> : Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49.2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	ознака не визначалась	0
49.3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти <i>Phytophthora capsici</i>	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 75 т/га. Середня маса плоду – 230 г. Вміст сухої речовини – 17 %. Тривалість періоду до досягнення – 72 доби. Товщина стінки плоду – 5,9 мм. Вміст загального цукру – 6 %. Вміст клітковини – 1,5 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.