

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.**Заявка № 2025196005 Назва сорту:** Джеа**Заявник (код):** 3424 **Підтримувач сорту (код):** 3424**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 03.09.2025**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 250400**Орган, що провів випробування:** CREA (Italy)**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	від середньої до довгої	6	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	від відсутньої або дуже низької до низької	2	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	відсутня або дуже низька	1	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	від середньої до довгої	6	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	висока	7	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	середня	5	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожай насіння (за стандартної вологості за 14%), т/га	2,0
2	Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га	20,0
3	Вміст білка, %	20,5
4	Вміст клітковини, %	28,5
5	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev f. <i>medicaginis</i> Dietr.)	7
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora aestivalis</i> Sydow.)	8
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Uromyces striatus</i> Schroter (II і III))	7
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): чорна плямистість стебел (<i>Napiciadium medicaginis</i> Lobik.)	7
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta imperfecta</i> Peck.)	7
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість (<i>Pseudopeziza medicaginis</i> Sacc.)	8

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.