

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 2026196001 Назва сорту: НЕФЕЛІ

Заявник (код): 1329 Власник сорту (код): 1329

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 11.05.2026

Свідоцтво про державну реєстрацію № 260320

Орган, що провів випробовування: Ministry of Rural Development and Food, Greece

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	напівпрямий	3	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	середня	5	
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	середня	5	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	середня	5	
5	Час початку цвітіння	пізній	7	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	відсутня або дуже низька	1	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	висока	7	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	середня	5	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	від середньої до високої	6	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	висока	7	

Показники господарської придатності, за інформацією, наданою заявником

№ з/п	Показник	Значення
1	Урожай насіння (за стандартної вологості за 14%), т/га	1,5
2	Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га	18
3	Вміст білка, %	20
4	Вміст клітковини, %	30
5	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошнеста роса (<i>Erysiphe communis</i> Grev f. <i>medicaginis</i> Dietr.)	9
6	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (<i>Peronospora aestivalis</i> Sydow.)	9
7	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): іржа (<i>Uromyces striatus</i> Schroter (II i III))	9
8	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): чорна плямистість стебел (<i>Napiciadium medicaginis</i> Lobik.)	9
9	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): аскохітоз (<i>Ascochyta imperfecta</i> Peck.)	9
10	Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість (<i>Pseudopeziza medicaginis</i> Sacc.)	9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.