

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 17118001 Назва сорту: Меліто **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180331

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Листкова розетка: за шириною основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	довгий	7
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мала	3
12	Листкова пластинка: надрізи краю	відсутні	1
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	ознака не визначалась	0
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
17	Коренеплід: за товщиною	середній	5
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	тонкий	3
19	Коренеплід: форма	округла	2
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	рожеве	2
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	ознака не визначається	0
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	дуже ранній	1
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	слабка	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 36 т/га. Тривалість періоду до досягання – 26 діб. Середня маса плоду – 28 г. Вміст сухої речовини – 5,3 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.