

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

**Заявка № 15118010 Назва сорту:** Ніколь **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 647 2201

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.12.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171384**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Листкова розетка: за шириною основи	широка	7
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	жовтуватий	2
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
17	Коренеплід: за товщиною	товстий	7
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	товстий	7
19	Коренеплід: форма	поперечноеліптична	1
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2
21	Коренеплід: форма основи	округла	4
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	двокольорове	2
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	кармінове	3
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	малий	3
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	матове біле	2
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність – 45 т/га. Тривалість періоду до досягання – 40 діб. Середня маса плоду – 35 г.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.