

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 16118004 Назва сорту: Форум **Заявник (код):** 1997 **Власник сорту (код):** 1997

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180328

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля	наявне	9
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5
4	Листкова розетка: за шириною основи	вузька	3
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3
6	Листок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: форма	вузькооберненояцеподібна	1
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3
17	Коренеплід: за товщиною	тонкий	3
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	тонкий	3
19	Коренеплід: форма	вузькопрямокутна	7
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3
21	Коренеплід: форма основи	гостра	2
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	яскраво-червоне (забарвлення кіноварі)	1
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3
27	Коренеплід: забарвлення м'якоті	напівпрозоре біле	1
28	Час досягання	ранній	3
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	середня	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 26 т/га. Тривалість періоду до досягання – 30 діб. Середня маса плоду – 23 г. Вміст сухої речовини – 6,7 %. Вміст вітаміну С – 24,9 мг%.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ПЛС, ЗГр.