

Вид: Редька чорна *Raphanus sativus* L. var. *niger* (Mill.) S.Kerner

Заявка №: 15117001 **Назва сорту:** Багіра **Заявник (код):** 2200 2201

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171386

Опис морфологічних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	диплоїд	2
2	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
3	Сім'ядолі: форма	широкосерцеподібна	2
4	Сім'ядолі: розмір	середній	5
5	Листкова розетка: кількість повністю розвинутих листків	велика	7
6	Листок: положення у просторі	напівпряме	2
7	Листок: за довжиною	довгий	7
8	Листкова пластинка: форма	вузькооберненояйцеподібна	1
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого кольору	відсутній	3
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
11	Листкова пластинка: лопаті (розсіченість до центральної жилки)	наявна	9
12	Листкова пластинка: кількість лопатей (як для 11)	велика	7
13	Листкова пластинка: розмір кінцевої лопаті	великий	7
14	Листкова пластинка: розрізи краю за глибину	глибокі	7
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9
16	Коренеплід: за довжиною	короткий	3
17	Коренеплід: за товщиною	товстий	7
18	Коренеплід: форма	округла	2
19	Коренеплід: форма головки кореня	округла	2
20	Коренеплід: форма основи	округла	4
21	Коренеплід: забарвлення шкірки	чорне	9
22	Лише для сортів з білим коренеплодом. Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення країв головки	ознака не визначається	0
23	Лише для сортів з білим коренеплодом. Коренеплід: антоціанове забарвлення	ознака не визначається	0
24	Коренеплід: горбкуватість поверхні	відсутня або дуже слабка	1
25	Коренеплід: забарвлення мякоті	матове біле	2
26	Час збиральної стигlostі	пізний	7
27	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність – 45т/га. Тривалість періоду до досягнення – 95 діб. Середня маса плоду – 250 г. Вміст сухої речовини – 7,6 %.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.