

**Вид:** Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

**Заявка № 16120005 Назва сорту:** Лозано **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 27.12.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171405**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	чорне	3
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	широкоеліптична	7
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма позаднього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салату)	горизонтальне	5
16	Листок: форма	оберненойцеподібна	7
17	Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глясுவатість верхнього боку	помірна	5
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	дуже сильна	9
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	глибока	7
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	ознака не визначалася	0
34	Час збиральної стиглості	середній	5
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	середній	5
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	низька	3
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	дуже слабка	1
39	Стійкість проти борошнистої роси ( <i>Bremia lactucae</i> ) Izolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	ознака не визначалася	0
41	Стійкість проти попелици (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i> )	ознака не визначалася	0
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалася	0

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 24. Тривалість періоду до досягання, діб – 63. Стійкість до хвороб, балів (1-9):  
 несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 9, біла гниль – 8, септоріоз – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЗГр.