

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 16120006 Назва сорту: Лугано **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171406

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	малий	3
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	тонкий	3
15	Листок: положення за збиральної стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	поперечно-вузькоеліптична	6
17	Листок: форма верхівки	ознака не визначалась	0
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	слабка	3
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глянуватість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	сильна	7
26	Листок: розмір пухирів	малий	3
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	дуже сильна	9
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	наявна	9
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	мілка	3
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабке	1
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) I isolate B1:16	наявна	9
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	ознака не визначалася	0
41	Стійкість проти попелици (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	ознака не визначалася	0
42	Стійкість проти <i>fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалася	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 24. Тривалість періоду до досягання, дів – 64. Стійкість до хвороб, балів (1–9): несправжня борошниста роса – 8, борошниста роса – 9, біла гниль – 8, септоріоз – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.