

Вид: Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

Заявка № 16121003 Назва сорту: Сейшел **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171458

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: діаметр	середній	5
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу	заокруглена	2
4	Серцевина: тенденція до знебарвлення	помірна	2
5	Листок: вигин верхньої частини	слабкий	1
6	Листок: за довжиною	середній	5
7	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною	широкий	7
8	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною	ознака не визначається	0
9	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма	широкооберненойцеподібна	5
10	Листок: забарвлення	зелене	6
11	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною	відсутня або дуже мілка	1
12	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування	ознака не визначалась	0
13	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною	ознака не визначається	0
14	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю	помірна	2
15	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною	ознака не визначалась	0
16	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю	помірна	5
17	Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість	помірна	5
18	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка	ознака не визначається	0
19	Центральна жилка листка: за шириною біля основи	широка	7
20	Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи	ознака не визначається	0
21	Стебло: за висотою	середнє	5
22	Стебло: фасціація	нявна	9
23	Стебло: положення бічних пагонів	пряме	1
24	Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків	округла	3
25	Квітка: забарвлення	фіолетово-блакитне	5
26	Час споживчої стиглості	середній	5
27	Час стрілкування	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 23. Період від сходів до збирання врожаю, днів – 46. Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз – 6, церкоспороз – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.