

**Вид:** Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

**Заявка № 17130002 Назва сорту:** Кугар **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.01.2018

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180488**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	короткі	3
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
3	Листкова пластинка: пухирчастість	слабка	3
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1
5	Черешок: положення	напівпохиле	3
6	Черешок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	округла	6
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2
10	Листкова пластина: форма верхівки	заокруглена	3
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плескатата	2
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	високе	7
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	низьке	3
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сівби, 15 % рослин)	пізній	7
16	Насініна: кольочки (стигле насіння)	відсутні	1
17	Стійкість до <i>Peronospora farinose f. spinaciae</i>	наявна	9
18	Стійкість до <i>Cucumbe mosaic virus (CMV)</i>	відсутня	1
19	Листок: антоцианове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum f. sp. spinaciae</i>	наявна	9

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 3,5. Товарна врожайність, т/га – 3,2.Період від сходів до збирання врожаю, діб – 27. Маса 1000 насінин, г – 10. Вміст у листках: сухої речовини, % – 5,1, загального цукру, % – 17,5, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 19,0, нітратів, мг/100 г с.р. – 160. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Peronospora spinaciae* Laub.) – 8, плямистість темно-оливкова (*Cladosporium macrocarpum* Preuss.), церкоспороз (*Cercospora spinaciae* Oud.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, Згр.