

Вид: Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

Заявка № 16130003 Назва сорту: Тукан Заявник (код): 1730 Власник сорту (код): 1730

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171460

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
3	Листкова пластинка: пухирчатість	слабка	3
4	Листкова пластинка: часточковість	ознака не визначалась	0
5	Черешок: положення	напівпохиле	3
6	Черешок: за довжиною	короткий	3
7	Листкова пластинка: положення	горизонтальне	5
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	округла	6
9	Листкова пластинка: вигин краю	загнутий назовні	3
10	Листкова пластинка: форма верхівки	заокруглена	3
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	опукла	3
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	середнє	5
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	середнє	5
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сіви, 15 % рослин)	пізній	7
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1
17	Стійкість до <i>Peronospora farinose</i> f. <i>spinaciae</i>	ознака не визначалась	0
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	ознака не визначалась	0
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	ознака не визначалась	0
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 24. Товарна врожайність, т/га – 22. Період від сходів до збирання врожаю, діб – 43. Маса 1000 насінин, г – 12,4. Вміст у листках: сухої речовини, % – 10,4, загального цукру, % – 1,5, вітаміну С, мг/100 г с.р. – 56, нітратів, мг/100 г с.р. – 94. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): пероноспороз (*Peronospora spinaciae* Laub.), плямистість темно-оливкова (*Cladosporium macrocarpum* Preuss.), церкоспороз (*Cercospora spinaciae* Oud.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.