

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.**Заявка № 15263005 Назва сорту:** Белліда **Заявник (код):** 2090 **Власник сорту (код):** 2090**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №**Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.12.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171464****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Дерево: сила росту	слабка	3
2	Дерево: тип	роздгалужений	2
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	прямий	1
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1
5	Однорічний лагін: за товщиною	середній	5
6	Однорічний лагін: міжвуля за довжиною	середні	5
7	Однорічний лагін: забарвлення з під сонячного боку	червоно-коричневе	2
8	Однорічний лагін: опушення (на периферичні половині пагона)	слабке	3
9	Однорічний лагін: кількість сочевичок	середня	3
10	Листкова пластина: положення відносно пагона	спрямоване догори	1
11	Листкова пластина: за довжиною	середня	5
12	Листкова пластина: за шириною	вузька	3
13	Листкова пластина: відношення довжина/ширина	середнє	5
14	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
15	Листкова пластина: форма краю (верхня половина)	двігігородчаста	2
16	Листкова пластина: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1
17	Черешок: за довжиною	довгий	7
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	темно-рожеве	4
20	Квітка: діаметр (гелюстки розправлені)	середній	5
21	Квітка: розташування пелюсток	проміжне	2
22	Квітка: положення приймочок відносно піляків	на одному рівні	2
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	помірне	5
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6
25	Плід: за висотою	середні	5
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення висота/діаметр	має	3
28	Плід: основна форма	приплюснуто-куляста	7
29	Плід: ребристість	помірна	2
30	Плід: огорбіння й нерівності на кінці чашечки	помірні	2
31	Плід: розмір чашечки	середній	5
32	Плід: чашолисток за довжиною	середній	5
33	Плід: наліт на шкірці	помірний	2
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2
35	Плід: основне забарвлення	жовто-зелене	5
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5
39	Плід: характер покривного забарвлення	тильки суцільній рум'янець	1
40	Плід: смуги за шириною	ознака не визначається	0
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1
42	Плід: площа заіржавлення на щіках	відсутня або мала	1
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3
45	Плід: розмір сочевочки	середній	5
46	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5
47	Плід: плодоніжка за товщиною	середня	5
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5
49	Плід: лійка плодоніжки за шириною	середня	5
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	середнє	5
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	середнє	5
52	Плід: твердість мякоті	тверда	7
53	Плід: забарвлення мякоті	кремове	2
54	Плід: відкритість насінніх комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1
55	Час початку цвітіння	середній	5
56	Час збирання врожаю	дуже пізній	9
57	Час споживчої стигlosti	пізній	7

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Середня врожайність сорту становить 40,0 т/га. Середній урожай з дерева – 15,0 кг, середня маса плоду – 175 г, максимальна – 200. Вміст вітаміну С, мг % – 6,1, загального цукру, % – 15,0, пектинових речовин, % – 0,92, сухої речовини в плодах, % – 16,0, загальна кислотність, % – 1,0. Стійкість до ураження борошнистою росою – 7 балів, паршею – 5. До пошкодження попелицею – 8 балів. Зимостійкість – 6 балів. Ступінь підмерзання – 4 бали, вимерзання квіткових бруньок становить 1 бал. Стійкість до посухи – 5 балів.Період зберігання – 155 діб. Група стигlosti – пізня. Напрям використання – споживання у свіжому вигляді. Транспорtabельність – 8 балів, дегустаційна оцінка – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.