

Вид: Лілійник *Hemerocallis L.*

Заявка № 14326001 Назва сорту: Світанок над Удаєм Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 28.09.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171327

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Плоїдність	тетраплоїд	4
2	Рослина: за життєвою формою (кореневищний розетковий геофіт)	міцно спляча	1
3	Рослина: час початку вегетації	середній	5
4	Рослина: за висотою	середня	5
5	Рослина: габітус	компактний	1
6	Листок: положення у просторі	поникле біля верхівки	2
7	Листок: за довжиною	середній	5
8	Листок: за шириноро	широкий	7
9	Листок: забарвлення	помірно зелене	2
10	Квітконос: розташування відносно листків	виступаючий над листками	2
11	Квітконос: залишкіність	відсутня	1
12	Суцвіття: за щільністю	шільне	9
13	Суцвіття: приквітки	відсутні	1
14	Суцвіття: за довжиною	середнє	5
15	Час цвітіння	середньоранній	3
16	Рослина: тип цвітіння	ремонтантний	2
17	Рослина: характер цвітіння	денне	1
18	Рослина: тривалість цвітіння	мала	3
19	Квітка: кількість на рослині	мала	3
20	Квітка: кількість відкритих на рослині	велика	7
21	Квітка: діаметр	середній	5
22	Квітка: за типом	проста	1
23	Лише для сортів з простою квіткою. Квітка: форма	округла	1
24	Квітка: забарвлення (кольорова група)	жовте	2
25	Квітка: за розподілом забарвлення на частках оцвітини	однокольорова	1
26	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
27	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку внутрішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
28	Квітка: основне забарвлення внутрішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
29	Квітка: основне забарвлення зовнішнього боку зовнішньої пелюстки	жовто-оранжеве	13
30	Квітка: візерунок	відсутній	1
31	Квітка: основне забарвлення візерунка на частках оцвітини	ознака не визначається	0
32	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
33	Лише для змішаних та багатокольорових сортів за розподілом забарвлення квіток. Квітка: третинне забарвлення	ознака не визначається	0
34	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: первинне забарвлення	ознака не визначається	0
35	Лише для двотонових, оберненодвотонових, двокольорових та оберненодвокольорових сортів. Квітка: вторинне забарвлення	ознака не визначається	0
36	Квітка: аромат	відсутній	1
37	Оцвітина: відносне розташування часток	дотичне	3
38	Оцвітина: розташування внутрішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3
39	Оцвітина: розташування зовнішніх часток відносно площини квітки	слабко або сильно відігнуті донизу	3
40	Квітка: форма верхівки внутрішньої пелюстки	стисла	2
41	Квітка: форма верхівки зовнішньої пелюстки	загострена	1
42	Квітка: форма краю внутрішньої пелюстки	гофрована	3
43	Квітка: форма краю зовнішньої пелюстки	хвиляста	2
44	Квітка: характер поверхні внутрішньої пелюстки	зморшкувата	2
45	Квітка: характер поверхні зовнішньої пелюстки	зморшкувата	2
46	Квітка: трубка оцвітини за довжиною	коротка	1
47	Квітка: за довжиною тичинки	довга	7
48	Тичинка: основне забарвлення	жовто-оранжеве	13
49	Тичинка: забарвлення пиляків	помаранчево-коричневе	1
50	Пилок: забарвлення	помаранчеве	3
51	Пилок: життєздатність	середня	5
52	Плід: відсоток плодоцвітіння	середній	5
53	Стовпчик: основне забарвлення	жовто-оранжеве	13
54	Квітка: положення приймочки відносно пиляків	вище	7
55	Приймочка: забарвлення	жовто-оранжеве	13
56	Рослина: тривалість періоду вегетації	мала	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослини 65 см. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння – 71 доба. Тривалість цвітіння суцвіття – 8 діб. Тривалість цвітіння рослини – 20 діб. Повторне цвітіння протягом періоду вегетації наявне. Декоративність – 75 балів. Коєфіцієнт вегетативного розмноження – 6. Зимостійкість та посухостійкість – 9 балів. Стійкість проти пошкодження комариком лілійника та павутинним кліщем – 9 балів. Стійкість проти ураження гнилями кореневої шийки та хлорозом – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.