

Вид: Квасоля звичайна (зернова) *Phaseolus vulgaris* L.

Заявка № 15025001 Назва сорту: Рось **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.02.2018 **Патент № 180095**

Дата пріоритету: 28.10.2015

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 14.02.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180553

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1
2	Рослина: інтенсивність антоціанового забарвлення гіпокотила	ознака не визначається	0
3	Рослина: тип росту	кущовий	1
4	Лише виткі сорти. Рослина: архітектонка	ознака не визначається	0
5	Лише кущові сорти. Рослина: тип	несланкий	1
6	Лише кущові сорти. Рослина: за висотою	низька	3
7	Лише виткі сорти. Рослина: початок завивання (80 % рослин)	ознака не визначається	0
8	Лише виткі сорти. Рослина: швидкість завивання	ознака не визначається	0
9	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
10	Листок: зморшкуватість	слабка	3
11	Верхівковий листочок: розмір	малий	3
12	Верхівковий листочок: форма	трикутна	1
13	Верхівковий листочок: верхівка за довжиною	довга	3
14	Лише кущові сорти. Суцвіття: положення (за повного цвітіння)	проміжне	2
15	Квітка: розмір приквіток	малий	3
16	Квітка: забарвлення паруса	рожеве	3
17	Квітка: забарвлення крил	рожеве	3
18	Лише кущові сорти. Біб: за довжиною (за виключенням дзьобика)	середній	5
19	Лише виткі сорти. Біб: за довжиною (як для 18)	ознака не визначається	0
20	Біб: за шириною	середній	5
21	Біб: за товщиною	тонкий	3
22	Біб: форма поперечного перерізу (через насінину)	яйцеподібна	2
23	Біб: відношення товщини до ширини	середнє	5
24	Біб: основне забарвлення	зелене	2
25	Біб: інтенсивність основного забарвлення	слабка	3
26	Біб: вторинне забарвлення	наявне	9
27	Біб: вторинне забарвлення	фіолетове	3
28	Біб: щільність плям вторинного забарвлення	щільна	7
29	Біб: волокнистість вентрального (черевного) шва	відсутня	1
30	Біб: ступінь вигину	відсутній або дуже слабкий	1
31	Біб: форма вигину	увігнута	1
32	Біб: форма верхівки (за виключенням дзьобика)	від загостреної до заокругленої	2
33	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5
34	Біб: вигин дзьобика	слабкий	3
35	Біб: текстура поверхні	помірно шерехата	5
36	Біб: звуження (в сухому стані)	помірне	2
37	Насіння: маса	середня	5
38	Насіння: форма поздовжнього розрізу	від округлої до еліптичної	2
39	Сорти з ниркоподібним насінням. Насіння: ступінь вигину	ознака не визначається	0
40	Насіння: форма поперечного перерізу	широкоеліптична	4
41	Насіння: за шириною в поперечному перерізі	середня	5
42	Насіння: за довжиною	середня	5
43	Насіння: кількість кольорів	два	2
44	Насіння: основне забарвлення (найбільша зона)	бежеве	5
45	Насіння: вторинне забарвлення	фіолетове	6
46	Насіння: розподіл вторинного забарвлення	по всій насінині	3
47	Насіння: вираження орнаменту	слабке	3
48	Час цвітіння (50 % рослин мають щонайменше одну квітку)	ранній	3
49,1	Стійкість проти антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до антракнозу квасолі (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>): Pasa Kappa	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти вірусної мозаїки квасолі Common Mosaic Necrosis Virus (CMNV)	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти кутастої бактеріальної плямистості (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>phaseolicola</i>)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти звичайної плямистості квасолі (<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i>)	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зерна (за стандартної вологості 14 %) – 2,8 т/га; висота прикріплення нижнього бобу – 19 см; висота рослин – 50 см; тривалість вегетації рослин – 90 днів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.