

Вид: Сочевиця харчова *Lens culinaris* Medik.

Заявка № 17027002 Назва сорту: Антоніна **Заявник (код):** 1751 **Власник сорту (код):** 1751

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.05.2018 **Патент № 180917**

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.05.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180757

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сім'ядолі: забарвлення	зеленувато-жовте	2
2	Рослина: габітус	напівпрямий	3
3	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
4	Рослина: за висотою (під час цвітіння)	середня	5
5	Рослина: інтенсивність галуження	помірна	5
6	Листок: форма	еліптична	1
7	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
8	Листок: кількість листочків	середня	5
9	Листочок: розмір	середній	5
10	Суцвіття: кількість квіток на вузлі	дві	3
11	Квітка: розмір	середній	5
12	Квітка: забарвлення паруса	біле	1
13	Квітка: фіолетові смуги на парусі	відсутні	1
14	Квітка: фіолетові смуги на крилах	відсутні	1
15	Біб: інтенсивність забарвлення (перед збиральною стилістю)	помірна	5
16	Біб: кількість насінневих зачатків	один або два	2
17	Біб: забарвлення за збиральною стилістю	зелене	2
18	Біб: за довжиною (без дзьобика) (як для 17)	середній	5
19	Біб: за шириною	середній	5
20	Біб: форма верхівки (як для 17)	заокруглена	1
21	Суха насінина: за шириною	широка	7
22	Суха насінина: профіль у поздовжньому розрізі	еліптичний	1
23	Суха насінина: кількість кольорів	один	1
24	Суха насінина: основне забарвлення шкірки	зеленувато-жовте	2
25	Лише для сортів з двома і більше забарвленнями шкірки. Суха насінина: тип орнаментациї	ознака не визначається	0
26	Сухе насіння: маса	велика	7
27	Час цвітіння	середній	5
28	Час достигання	середній	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин становить 55 см. Тривалість періоду вегетації – 73 доби. Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) – 2,1 т/га, маса 1000 насінин – 55,8 г. Висота кріплення нижнього бобу – 16 см. Вміст білка – 23,4 %. Стійкість бобів до розтріскування – 6 балів. Дружність достигання – 8 балів. Стійкість рослин до вилягання та посухостійкість – 7 балів. Стійкість проти ураження аскохітозом – 6 балів, фузаріозом, та бактеріальним в'яненням – 7. Стійкість проти попелиці – 6 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.