

Вид: Регнерія шорсткостеблова *Roegneria trachycaulon* (Link) Nevski

Заявка № 15214001 Назва сорту: Златослава **Заявник (код):** 1970 1669 **Власник сорту (код):** 1970 1669

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.09.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171227

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоідність	диплоїд	2
2	Рослина: габітус куща восени першого року вегетації	напівпрямий	3
3	Листок: наліт восени першого року вегетації	відсутній	1
4	Рослина: тенденція до формування колоса в перший рік вегетації	наявна	9
5	Рослина: габітус куща другого року вегетації	прямий	1
6	Рослина: щільність куща другого року вегетації	середній	5
7	Рослина: за висотою другого року вегетації	середня	5
8	Стебло: шерехатість	слабка	3
9	Листок стебловий: за довжиною	довгий	7
10	Листок стебловий: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Листок стебловий: восковий наліт	відсутній	1
12	Листок стебловий: шерехатість	наявна	9
13	Листок прапорцевий: відношення довжина/ширина	велике	7
14	Рослина: час початку колосіння	середній	5
15	Колос: за довжиною	довгий	7
16	Колос: форма	пряма	1
17	Рослина: початок цвітіння	середній	5
18	Нижня квіткова луска: шипики на спинці	наявні	9
19	Нижня колоскова луска: остюк за довжиною	короткий	3
20	Насінина: маса 1000 шт.	середня	5
21	Насіння: осипання	слабке	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Висота рослин – 110 см. Вміст білка – 13,1%, вміст клітковини – 24,3%. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості – 111 дб. Урожайність зеленої маси – 7 балів. Зимостійкість та посухостійкість – 9 балів. Стійкість до вилягання та обсіпання – 8 балів. Маса 1000 насінин – 3,1 г. Стійкість проти збудників хвороб: сажка, антракноз, аскохітоз, борошниста роса, жовта іржа, корончаста іржа – 9 балів, бура іржа – 8,1 бала, стеблова іржа – 7,8 бала.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, Л, П.