

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 15113028 Назва сорту: Оіда **Заявник (код):** 2020 **Власник сорту (код):** 2020

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.09.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171206

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гілокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	коротка	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1
5	Тілки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	ознака не визначається	0
6	Тілки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах I-го порядку)	короткі	3
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	дуже слабка	1
9	Стебло: опушення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Листок: пластинка за довжиною	коротка	3
12	Листок: пластинка за ширину	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	слабка	3
14	Листок: форма	овальна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1
17	Листок: форма поперечного перерізу	плоска	5
18	Листок: глянсуватість	помірна	5
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення пилляків	наявне	9
21	Плід: забарвлення (перед досягненням)	зеленувато-біле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досягненням)	дуже слабка	1
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	короткий	3
26	Плід: діаметр	великий	7
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже мале	1
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	квадратна	4
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	трикутна	2
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	відсутнія або дуже слабка	1
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	відсутнія або дуже слабка	1
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за досягнення)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягнення)	помірна	5
35	Плід: глянсуватість	помірна	5
36	Плід: порожнина в плодоніжці	наявна	9
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	дуже мілка	1
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	мілкі	3
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: м'якоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	ознака не визначалась	0
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час досягнення	дуже ранній	1
48.1	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 0 (<i>Tobacco Mosaic Virus (0)</i>)	наявна	9
48.2	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2 (<i>Tomato Mosaic Virus (1-2)</i>)	відсутня	1
48.3	Стійкість проти <i>Tobamovirus</i> : Штам збудника 1-2-3 (<i>Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3)</i>)	відсутня	1
49.1	Стійкість проти <i>Potato Virus Y (PVY)</i> : Штами збудника 0, 1, 1-2	відсутня	1
49.2	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1	ознака не визначалась	0
49.3	Стійкість до <i>Potato Virus</i> : Патотип 1 – 2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти <i>Phytophthora capsici</i>	відсутня	1
51	Стійкість проти <i>Cucumber Mosaic Virus (CMV)</i>	відсутня	1
52	Стійкість проти <i>Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)</i>	відсутня	1
53	Стійкість проти <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	наявна	9

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 73 т/га, тривалість періоду до досягнення – 65 діб, товщина стінки плоду – 0,7 мм, середня маса плоду – 200 г, вміст вітаміну С – 260 мг%, вміст загального цукру – 9%, вміст клітковини – 1,7%, вміст сухої речовини – 8,6%, стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): анtrakноз – 8, гниль верхівкова – 7, вірусні хвороби – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Згр.