

Вид: Салат посівний листовий *Lactuca sativa* L. var. *secalina*

Заявка № 14120001 Назва сорту: Гусар **Заявник (код):** 1781 **Власник сорту (код):** 1781

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 29.09.2017

Патент № 170610

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:

Свідоцтво про державну реєстрацію №

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насінина: забарвлення	біле	1
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	напівпряме	3
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю (як для 5)	нерозсічена	1
7	Рослина: діаметр	середній	5
8	Рослина: утворення головки	не утворює	1
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	ознака не визначається	0
10	Головка: за щільністю	ознака не визначається	0
11	Головка: розмір	ознака не визначається	0
12	Лише для сортів маслянистоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначається	0
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	ознака не визначається	0
14	Листок: за товщиною	середній	5
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листового і стеблового салатів)	напівпряме	3
16	Листок: форма	вузькоеліптична	1
17	Листок: форма верхівки	округла	3
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	жовтуватий	2
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірна	5
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0
24	Листок: глясுவатість верхнього боку	слабка	3
25	Листок: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1
26	Листок: розмір пухирів	середній	5
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначається	0
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначається	0
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначається	0
32	Листкова пластинка: жилкування	віялоподібне	2
33	Пазушне жилкування	відсутнє або дуже слабе	1
34	Час збиральної стиглості	ранній	3
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	ранній	3
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	середня	5
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	відсутня	1
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	ознака не визначається	0
39	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) I isolate B1:16	ознака не визначалася	0

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна урожайність – 18,3 т/га, тривалість періоду до досягання – 19 днів, стійкість до несправжньої борошнистої роси – 9 балів, стійкість до борошнистої роси – 9 балів, стійкість до білої гнилі – 9 балів, стійкість до септоріозу – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, Л, П.