

Вид: Цикорій листковий *Cichorium intybus* L. partim**Заявка № 15541001 Назва сорту:** Гіове**Заявник (код):** 840**Власник сорту (код):** 840**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:****Патент №****Дата пріоритету:****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 18.08.2017**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171254****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення у стадії 5-6 листків	наявне	9
2	Рослина: діаметр (повністю розвинена рослина)	середній	5
3	Листок: положення у просторі	напіввисхідне	3
4	Листок: за довжиною (за збіральної стигlosti)	довгий	7
5	Листок: за шириною	середній	5
6	Листок: форма	еліптична	2
7	Листок: забарвлення (за винятком центральної жилки)	червоне	3
8	Листок: інтенсивність забарвлення (як для 7)	сильна	7
9	Листок: глянсуватість	помірна	5
10	Листок: забарвлення центральної жилки	зелене	2
11	Листок: антоціанове забарвлення за збіральної стигlosti	наявне	9
12	Листок: поширення антоціанового забарвлення (як для 4)	суцільно	2
13	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення (як для 4)	лише дифузний	1
14	Листок: профіль верхнього боку	слабко увігнутий	2
15	Листок: пухирчатість	відсутня або дуже слабка	1
16	Листок: хвилястість краю	відсутнє або дуже мілке	1
17	Листок: розсічення краю за глибиною	ознака не визначалась	0
18	Листок: тип розсічення краю	наявне	9
19	Рослина: формування головки	сильна	7
20	Рослина: інтенсивність формування головки	довга	7
21	Головка: за довжиною	середній	5
22	Головка: діаметр	еліптична	2
23	Головка: форма поздовжнього розрізу	червоне	3
24	Головка: основне забарвлення зовнішніх листків	сильна	7
25	Головка: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	наявне	9
26	Головка: антоціанове забарвлення зовнішніх листків	суцільне	2
27	Головка: поширення антоціанового забарвлення зовнішніх листків	відсутнє	1
28	Рослина: формування стебла до збіральної стигlosti	ознака не визначалась	0
29	Лише для сортів, що формують стебло. Стебло: розгалуження	блакитне	2
30	Квітка: забарвлення	пізній	7
31	Час збіральної стигlosti	пізній	7
32	Час початку стрілкування	пізній	7

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність товарної продукції – 30 т/га. Урожайність насіння – 0,53 т/га. Тривалість періоду від повних сходів до споживчої стигlosti – 42 доби. Вміст загального цукру – 2,1 %. Вміст вітаміну С в зеленій масі – 19 мг/100 г. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe cichoracearum* D.C. f. *lactucae* Jacz.) – 7; сіра гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 7; церкоспороз (*Cercospora longissima* Trav.) – 8. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): попелиця-листокрутка (*Dysaphis reaumuri* Mordv.) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, Л, П.