

Вид: Цикорій салатний (ендивій) *Cichorium endivia* L.

Заявка № 15121003 Назва сорту: Куартана **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.08.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171255

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|---|------------------------|-----|
| 1 | Рослина: діаметр | великий | 7 |
| 2 | Рослина: габітус | ознака не визначається | 0 |
| 3 | Рослина: форма верхньої частини поздовжнього розрізу | заокруглена | 2 |
| 4 | Серцевина: тенденція до знебарвлення | помірна | 2 |
| 5 | Листок: вигин верхньої частини | ознака не визначалась | 0 |
| 6 | Листок: за довжиною | довгий | 7 |
| 7 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: за шириною | середній | 5 |
| 8 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: за шириною | ознака не визначається | 0 |
| 9 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: форма | оберненояцеподібна | 3 |
| 10 | Листок: забарвлення | жовтувато-зелене | 2 |
| 11 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: розсіченість за глибиною | середня | 5 |
| 12 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: жилкування | ознака не визначалась | 0 |
| 13 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: частки за довжиною | ознака не визначається | 0 |
| 14 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зубчастість краю | відсутня або слабка | 1 |
| 15 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: зубчастість краю за довжиною | ознака не визначалась | 0 |
| 16 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: хвилястість краю | слабка | 3 |
| 17 | Лише для сортів типу ескаріоль. Листок: зморшкватість | помірна | 5 |
| 18 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: відношення довжина частини листка без часток/загальна довжина листка | ознака не визначається | 0 |
| 19 | Центральна жилка листка: за шириною біля основи | широка | 7 |
| 20 | Лише для сортів кучерявого типу. Листок: антоціанове забарвлення біля основи | ознака не визначається | 0 |
| 21 | Стебло: за висотою | високе | 7 |
| 22 | Стебло: фасціація | нявна | 9 |
| 23 | Стебло: положення бічних пагонів | пряме | 1 |
| 24 | Лише для сортів типу ескаріоль. Стебло: форма прилистків | широкоеліптична | 2 |
| 25 | Квітка: забарвлення | блакитне | 4 |
| 26 | Час споживчої стиглості | пізній | 7 |
| 27 | Час стрілкування | пізній | 7 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність – 31 т/га. Період від сходів до збирання врожаю – 40 діб. Стійкість до хвороб, балів (1–9): пероноспороз – 8; церкоспороз – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, Л, П.