

Вид: Горіх грецький *Juglans regia* L.

Заявка № 16284002 Назва сорту: КОГИЛНИЧАНУ **Заявник (код):** 2237 **Власник сорту (код):** 2237

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: **Патент №**

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 27.09.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171182

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|--------------------------------|-----|
| 1 | Дерево: за силою росту | середнє | 5 |
| 2 | Дерево: габітус | напівпрямий | 2 |
| 3 | Дерево: щільність розміщення гілок | середня | 5 |
| 4 | Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення по периферії дерева) | на верхівці однорічного пагона | 1 |
| 5 | Однорічний пагін: забарвлення | світло-коричневе | 2 |
| 6 | Листок: форма бічних листочків | еліптична | 5 |
| 7 | Квітка: кількість чоловічих суцвіть | велика | 7 |
| 8 | Горіх: розмір | середній | 5 |
| 9 | Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов) | еліптична | 8 |
| 10 | Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва | еліптична | 8 |
| 11 | Горіх: форма у поперечному перерізі | еліптична | 3 |
| 12 | Горіх: коефіцієнт округлості | малий | 3 |
| 13 | Горіх: форма основи перпендикулярно до шва | округла | 2 |
| 14 | Горіх: форма верхівки (як для 13) | загострена | 1 |
| 15 | Горіх: виступ апікального кінчика | слабкий | 3 |
| 16 | Горіх: положення «сідельця» на шві | у верхній 2/3 | 2 |
| 17 | Горіх: помітність «сідельця» на шві | помірна | 5 |
| 18 | Горіх: «сідельце» на шві за шириною | середнє | 5 |
| 19 | Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною | мілка | 3 |
| 20 | Горіх: структура поверхні шкаралупи | слабко борозенчаста | 1 |
| 21 | Горіх: шкаралупа за товщиною | тонка | 3 |
| 22 | Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи | слабка | 3 |
| 23 | Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною | середні | 5 |
| 24 | Ядро: легкість видалення зі шкаралупи | легко | 3 |
| 25 | Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення | слабка | 3 |
| 26 | Ядро: розмір | середній | 5 |
| 27 | Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха | середнє | 5 |
| 28 | Час досягання | середній | 5 |
| 29 | Час початку листопаду | середній | 5 |
| 30 | Листок: стійкість до опадання | стійкий | 2 |
| 31 | Оплодень: стійкість до опадання | не стійкий | 1 |
| 32 | Час розпускання вегетативних бруньок | від раннього до середнього | 4 |
| 33 | Час цвітіння чоловічих квіток | пізній | 7 |
| 34 | Час цвітіння жіночих квіток | ранній | 3 |
| 35 | Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими | пізніше (протогенічний) | 3 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Середня урожайність сорту становить 5,0 т/га. Середній урожай з дерева – 50,0 кг. Маса плоду середня – 11,0 г. Зимостійкість – 7 балів, посухостійкість – 7 балів. Виповненість горіха – 8 балів. Твердість шкаралупи – 4 бала. Вихід ядра – 55%. Легкість видалення ядра – 9 балів. Вміст жиру – 68%, білка – 13,0%, вуглеводів – 8,5%. Дегустаційна оцінка – 8 балів. Стійкість проти пошкодження горіховою попелицею та горіховою міллю – 7 балів, до ураження бурою та чорною плямистістю – 7 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, Л.