

Вид: Ячмінь звичайний (ярий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 14020013 Назва сорту: Авгур Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.06.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171172

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
2	Нижні листки: опушення піхви	відсутнє	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	наявне	9
4	Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	помірне	5
5	Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком	мала	3
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	слабкий	3
7	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50 % колосів)	ранній	3
8	Остюки: антоціанове забарвлення кінчиків	відсутнє	1
9	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків	ознака не визначалась	0
10	Колос: восковий наліт	слабкий	3
11	Колос: положення у просторі	напівпряме	3
12	Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки)	середня	5
13	Колос: кількість рядів	два	1
14	Колос: форма	циліндрична	5
15	Колос: за щільністю	середній	5
16	Колос: за довжиною (без остюків)	довгий	3
17	Остюки: за довжиною (порівняно з колосом)	короткі	3
18	Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту	середній	5
19	Стрижень колосу: вигин першого сегмента	помірний	5
20	Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса)	від паралельного до ледь відхиленого	2
21	Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки	довші	3
22	Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною	короткі	1
23	Зернівка: плівка	наявна	9
24	Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски	слабка	3
25	Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски	відсутнє або дуже слабке	1
26	Зернівка: опушення вентральної боріздки	відсутнє	1
27	Зернівка: розташування лодикул	охоплююче	2
28	Зернівка: забарвлення алеїронового шару	сильне забарвлення	3
29	Тип розвитку	ярий	3
30	Колос: остюки	наявні	9
31	Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення	остюки	5
32	Зернівка: форма	видовжено-еліптична	5
33	Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски	тонкозморшкувата	1
34	Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски	відсутнє	9
35	Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка	поступовий	2
36	Вушка: форма верхівки	загострена	2
37	Вушка: охоплення соломини	перекриваюче	3
38	Язичок: ступінь виявлення	слабкий	3
39	Соломина: виповнення (переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	слабко виповнена	3
40	Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність)	наявне	9

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	36,5	44,4	38,8
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років			
ц/га	5,2	1,6	1,5
%	16	4	4
вегетаційний період, днів	89,0	90,0	92,0
висота рослин, см	64,8	65,2	64,8
маса 1000 зерен, г	43,9	45,8	50,3
стійкість до, бал:			
влягання	8,5	8,4	8,4
осипання	9,0	8,7	8,8
посухи	8,7	8,2	8,3
гельмінтоспоріозу	8,5	8,1	7,8
сажки	8,8	9,0	8,6
борошністої роси	8,4	8,7	8,1
вміст білка, %	13,3	13,2	13,0
вирівняність зерна, %	93,8	96,9	97,1
напряв використання	зерновий	зерновий	зерновий
Усереднена врожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	31,3	42,8	37,3
Величина довірчого інтервалу становить, ц/га	1,44	1,17	0,94

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп, Полісся.