

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 13040028 Назва сорту: ІНВ1010 Заявник (код): 1991 Власник сорту (код): 1991

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.07.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171156

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	короткий	3
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,7	31,4	21,6
± до усередненої урожайності, ц/га	-1,6	0,8	-4,8
± до усередненої урожайності, %	-8	3	-18
Стійкість до посухи, бал	7,4	8,1	8,8
Стійкість до вилягання, бал	8	8,3	9
Стійкість до осипання, бал	8	7,2	7,2
Зимостійкість, бал	6,6	7,9	7,7
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,4	8,8	7
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8,1	8,2	6,2
Стійкість до бактеріозу, бал	8,7	8,8	7
Стійкість до пероноспорозу, бал	7,9	8,8	6,3
Вміст білка, %	24,8	23,5	21,6
Вміст олії, %	44,5	47,8	49,4
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,7	0,6
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0	0,1
Усереднена урожайність сортів за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	30,6	26,4
Довірчий інтервал, ±	0,34	0,31	0,25

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.