

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 14040001 Назва сорту:** Камсін **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:**

**Патент №**

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 03.07.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171121**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	сильна	7
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	коротка	3
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	21,8	36	20,6
± до усередненої урожайності, ц/га	1,5	5,5	-5,8
± до усередненої урожайності, %	7	18	-22
Стійкість до вилягання, бал	9	7,8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,2	8,8
Стійкість до осипання, бал	8	7,4	7,2
Зимостійкість, бал	7	7,5	8
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8	8,6	7,6
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	8	8,4	6,2
Стійкість до бактеріозу, бал	9	8,6	6,8
Стійкість до пероноспорозу, бал	8	8,6	6,2
Вміст білка, %	24,9	23,1	21
Вміст олії, %	44,5	46,8	48,1
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,2
Усереднена урожайність сортів за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	30,6	26,4
Довірчий інтервал, ±	0,34	0,31	0,25

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Степ, Лісостеп.