

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 11016038 Назва сорту: МАРСТРИП **Заявник (код):** 924 **Власник сорту (код):** 924

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.8.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171153

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7
3	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	довгий	7
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	18,7	30,5	25,1
± до усередненої урожайності, ц/га	-1,7	-0,1	-1,3
± до усередненої урожайності, %	-8	0	-5
Стійкість до вилягання, бал	8,5	8,4	8,9
Стійкість до посухи, бал	7,6	7,8	8,7
Стійкість до осипання, бал	7,3	7	7,6
Зимостійкість, бал	6,4	8,1	8,1
Стійкість до пильщика ріпакового, бал	8,3	8,5	7,7
Стійкість до ріпакового квіткоїду, бал	7,6	8,1	6,6
Стійкість до бактеріозу, бал	8,8	8,8	7,4
Стійкість до пероноспорозу, бал	8,6	9	6,8
Вміст білка, %	23,1	21,6	20,2
Вміст олії, %	45,5	47,2	49,2
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,1
Усереднена урожайність сортів за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	30,6	26,4
Довірчий інтервал, ±	0,34	0,31	0,25

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Лісостеп.