

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 15045002 Назва сорту: Різдяна Заявник (код): 1581 Власник сорту (код): 1581

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:

Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 20.06.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171168

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	середня	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: форма росту	напіврозлога	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	середня	5
7	Листок: пухирчатість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (складного листка)	загостренояцевидна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	світле	3
13	Насіння: маса 1000 шт.	велика	7
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення, викликане реакцією пероксидази в насінній оболонці	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50 % рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	дуже ранній	1
20	Рослина: час достигання	дуже ранній	1

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	15,8	22,3	18,1
± до усередненої урожайності, ц/га	1	1	-2,4
± до усередненої урожайності, %	7	5	-12
Маса 1000 насінин, г	147,0	158,6	156,9
Висота рослин, см	71,2	80,5	75,9
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,7	8,9
Стійкість до осипання, бал	9,0	9,0	8,5
Стійкість до посухи, бал	8,4	8,2	8,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,7	12,9	14,2
Стійкість до пероноспорозу, бал	9,0	8,9	9,0
Стійкість до аскохітозу, бал	9,0	8,9	8,9
Стійкість до бактеріозу, бал	8,8	8,4	8,5
Стійкість до септоріозу, бал	8,8	9,0	9,0
Стійкість до фузаріозу, бал	9,0	8,9	9,0
Вміст білка, %	40,6	40,4	39,8
Вміст олії, %	22,4	21,3	20,5
Усереднена урожайність сортів, зареєстрованих за п'ять попередніх років, ц/га	14,8	21,3	20,5
Довірчий інтервал (ц/га), ±	0,32	0,5	0,57

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Степ, Лісостеп.